

ON VOUS A PRESCRIT



Pr **VYZULTA^{MC}**

Solution ophtalmique
de latanoprostène
bunod, 0,024% p/v

pour réduire la pression
intraoculaire élevée chez
les patients atteints de
glaucome à angle ouvert
ou d'hypertension oculaire



VOUS N'ÊTES PAS SEUL(E)!

En fait, plus de 250 000
Canadiens sont atteints d'un
glaucome à angle ouvert.

Consultez votre médecin
si vous souhaitez en savoir
plus sur votre problème
de santé.

PRENDRE VYZULTA^{MC}



DOSE HABITUELLE

- La dose recommandée de VYZULTA^{MC} est d'une goutte dans l'œil ou les yeux affectés, **une fois par jour le soir**.
- Appliquez une goutte de VYZULTA^{MC} dans chaque œil atteint.
- Utilisez VYZULTA^{MC} exactement comme votre médecin vous l'a prescrit. N'appliquez pas VYZULTA^{MC} plus d'une fois par jour.
- Si votre médecin vous a prescrit d'autres gouttes oculaires à prendre en plus de VYZULTA^{MC}, appliquez chaque médicament à au moins 5 minutes d'intervalle.



Réglez une alarme pour vous
rappeler de prendre vos gouttes
à la même heure chaque jour.



DOSE OUBLIÉE ET SURDOSE

- Si vous oubliez d'utiliser VYZULTA^{MC}, poursuivez votre traitement en prenant la dose suivante le lendemain.
- Si vous croyez avoir appliqué une trop grande quantité de VYZULTA^{MC}, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même si vous ne présentez pas de symptômes.



SOUVENEZ-VOUS

- Évitez de toucher l'œil, les paupières et les zones avoisinantes ainsi que les doigts ou toute autre surface avec l'embout compte-gouttes du flacon. Sinon, vous pourriez contaminer le médicament, ce qui pourrait vous causer une infection de l'œil.



- Évitez de toucher l'embout du flacon.
- Si vous portez des verres de contact, retirez-les avant d'appliquer VYZULTA^{MC}.
- Vous pouvez les remettre 15 minutes après avoir appliqué VYZULTA^{MC}.



Il est **très important** que vous preniez VYZULTA^{MC} **exactement** comme votre professionnel de la santé vous l'a indiqué. Consultez votre professionnel de la santé si vous avez des questions.



Pour en savoir plus au sujet de VYZULTA^{MC}, veuillez consulter votre professionnel de la santé et lire le feuillet d'information destiné aux patients, qui accompagne votre médicament.



CONSERVATION

- Avant la première ouverture, VYZULTA^{MC} doit être conservé au réfrigérateur (à une température comprise entre 2 °C et 8 °C).
- Une fois le flacon ouvert, VYZULTA^{MC} peut être conservé à la température ambiante (jusqu'à un maximum de 25 °C).
- VYZULTA^{MC} ne doit pas être utilisé après la date de péremption indiquée sur le flacon.
- **Protégez-le de la lumière et du gel.**
- Gardez-le hors de la portée et de la vue des enfants.



- Jetez le flacon et/ou toute quantité inutilisée du produit après 8 semaines.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Ne prenez pas VYZULTA^{MC} si :

- vous êtes allergique au latanoprostène bunod (l'ingrédient médicamenteux de VYZULTA^{MC});
- vous êtes allergique aux autres ingrédients de VYZULTA^{MC} ou à un composant de son contenant.

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre VYZULTA^{MC} afin de réduire la possibilité d'effets secondaires et pour assurer la bonne utilisation du médicament.

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment si :

- vous avez ou avez eu une inflammation de l'œil, y compris les affections appelées iritis ou uvéïte;
- vous avez ou avez eu une rupture de la capsule postérieure du cristallin;
- vous avez ou avez eu une enflure de l'œil, y compris une affection appelée œdème maculaire;
- vous avez ou avez eu une infection virale de l'œil appelée kératite herpétique;
- vous êtes atteint d'asthme sévère ou votre asthme n'est pas maîtrisé;
- vous utilisez d'autres gouttes oculaires;
- vous remarquez tout changement touchant vos cils ou la couleur de vos yeux;
- vous portez des verres de contact;
- vous êtes enceinte ou envisagez de le devenir;
- vous allaitez ou prévoyez allaiter.

Autres mises en garde à connaître :

- Conduite automobile et utilisation de machinerie
 - Après l'application de VYZULTA^{MC}, attendez que votre vision redevienne normale avant de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines.
- Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine alternative.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

Effets secondaires fréquents

- irritation de l'œil
- rougeur de l'œil
- douleur à l'œil
- douleur dans l'œil à l'endroit de l'application du produit
- écoulement nasal ou congestion nasale, mal de gorge

Effets secondaires rares

- altération du goût
- sensation de sable ou de corps étranger dans l'œil

Autres effets secondaires

- VYZULTA^{MC} pourrait causer un changement de couleur de l'œil ou de la paupière. Le changement de la couleur de l'œil pourrait ne pas être perceptible avant plusieurs mois, voire plusieurs années. Les changements de la couleur de l'œil et de la paupière pourraient être permanents. Si la couleur de votre œil a changé, informez-en votre médecin. Il pourrait examiner vos yeux plus souvent.
- VYZULTA^{MC} pourrait aussi faire paraître vos cils plus épais et plus longs qu'à l'habitude et faire augmenter leur nombre. Les changements touchant les cils sont réversibles après l'arrêt du traitement par VYZULTA^{MC}.

EFFETS SECONDAIRES GRAVES ET MESURES À PRENDRE

Consultez votre professionnel de la santé dans tous les cas si vous constatez un des effets secondaires rares suivants :

- Kératite bactérienne (infection de l'œil) : douleur ou rougeur de l'œil, détérioration de la vision, écoulement de l'œil, sensibilité de l'œil à la lumière, enflure de l'œil ou de la paupière, larmolement ou production de larmes.
- Œdème maculaire (gonflement ou accumulation de liquide dans le centre de la rétine) : vision trouble, vision trouble ou déformée près du centre ou au centre du champ de vision, possibilité que les couleurs paraissent estompées ou ternes.

En utilisant VYZULTA^{MC}, vous pourriez ressentir des effets secondaires autres que ceux qui figurent dans cette liste. Si vous présentez un effet secondaire qui n'est pas mentionné dans cette liste, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Consultez votre professionnel de la santé si vous souhaitez en savoir plus sur VYZULTA^{MC}. Lisez la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements destinés aux patients, en balayant le code QR ci-dessous. Il est également possible de se procurer la monographie du produit en appelant au **1-888-459-5000**.

